



فاویسم

تهیه کننده	خانم س-مرادی - سرپرستار بخش اطفال
تأیید کننده علمی	خانم دکتر صحرانیان متخصص اطفال و مسئول علمی بخش
ناظر کیفی	آقای ع - فرمانی - سوپروایزر آموزش آقای م - بیات - سوپروایزر آموزش سلامت
شماره سند	W-PE-037-R03
ویرایش سوم	اردیبهشت 1404
منابع	منابع: کتاب راهنمای بالینی پرستاری کودکان Email: beheshtihospital@kaums.ac.ir

در صورت بروز تب، کودک را با آب ولرم پا شویید. کنیز از شیاف استامینوفن استفاده و به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

هیچ دارویی را بدون نظر پزشک به کودکان ندهید و در صورت مراجعه به پزشک حتماً بگویید کودک کتان فاویسمی است.

علائمهای فاویسمیها بصورت تب، تهوع، استفراغ، سرگیجه و بیحالی، زردی و پررنگ شدن ادرار به رنگ چای و یا گاهی به رنگ خون و کم شدن میزان ادرار میباشد. در این گونه موارد به کودکان مایعات شیرین و بیرنگ مانند آب سیب و یا آب انگور بدهید و به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کنید.

دقت کنید کودکان در معرض برخی مواد شیمیایی مانند نفتالین، بنزن و حشرهکشها قرار نگیرد.

همچنین مصرف برخی از داروها برای کودک شماممنوع میباشد مانند داروهای مالاریا، میباشد، مانند: کوتریماکسازول، ویتامین کا مثل: کلرکین، پریماکین، آسپرینو. ...

با انجام یک آزمایش ساده خون و اندازه گیری میزان آنزیم G6PD می توانید متوجه شوید کودکان فاویسمی است یا نه از بروز مشکلات بعدی جلوگیری نماید و بیاد داشته باشید که

پیشگیری همیشه بهتر از درمان است

g6pd
DEFICIENCY
.ORG

والدین گرامی: کودک شمامبتلابه بیماری فاویسم است که G6PD علت آن نقص یا کمبود آنزیمی در گلبول قرمز به نام جی سیکس پی دی می باشد. این بیماری بدن را مصرف باقلا، بعضی از داروها و یا بتلابه بعضی از عفونتها ایجاد میشود.

بیماری فاویسم چه علائمی دارد؟

وقتی کودک شمامدر معرض بعضی از داروها قرار گیرد و یا به بعضی از عفونتها مبتلا شود یا باقلا به هر شکل (خام یا پخته (مصرف نماید، 24 تا 48 ساعت و بعضی اوقات 5 تا 24 ساعت پس از تماس، علائم به شکل تب، تهوع، استفراغ، دل درد، اسهال، تیره شدن رنگ ادرار، رنگ پریدگی، سرگیجه، کم شدن ادرار و تپش قلب نمایان میشود. در صورت مشاهده علائم فوق کودک خود را به نزدیکترین مرکز درمانی برسانید.



در صورتی که کودک شمامبتلابه فاویسم

است موارد زیر را رعایت کنید:

رژیم غذایی کودک شمامعدای است بجای آنکه مجاز به مصرف باقلا خام یا پخته نمیشود. تا حد امکان از تماس کودک با پوست باقلا نیز خودداری کنید. حتی کودک فاویسمی خود را به زمین باقلا هم نبرد.



اگر به کودک فاویسمی خود شیر میدهند شمامهم باید از مصرف باقلا خودداری کنید و اگر حتی یک دانه هم مصرف کردید باید تا ۳ روز شیر مادر را قطع کنید.

در صورت تمایل جهت استفاده از خدمات مشاوره تخصصی،

سوختگی و ترمیمی از روش های زیر استفاده نمائید.

۱- ایمیل: amiralmomeninbh@sums.ac.ir

۲- سایت:

amiralmomeninhospital.sums.ac.ir

۳- سامانه پیامک بیمارستان: ۰۹۹۱۲۰۶۴۳۲۷