



فاویسم

تهیه کننده	خانم س-مرادی - کارشناس پرستاری سرپرستاربخش اطفال
تأیید کننده علمی	خانم دکتر صحرائیان متخصص اطفال و مسئول علمی بخش
شماره سند	W-PE-037-R02
ویرایش سوم	خرداد ۱۴۰۱
منابع	منابع : کتاب راهنمای بالینی پرستاری کودکان Email: beheshtihospital@kaums.ac.ir

هیچ دارویی را بدون نظریزشک به کودکان ندهید و در صورت مراجعه به پزشک حتماً بگویید کودکتان فاویسمی است.

علائمهای فاویسمیها بصورت تب، تهوع، استفراغ، سرگیجه و بیحالی، زردی و پررنگ شدن ادرار به رنگ چای و یا گاهی به رنگ خون و کم شدن میزان ادرار میباشد. در این گونه موارد به کودکان مایعات شیرین و بیرنگ مانند آب سیب و یا آب انگور بدهید و به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کنید.

دقت کنید کودکان در معرض برخی مواد شیمیایی مانند نفتالین، بنزن و حشرهکشها قرار نگیرند.

همچنین مصرف برخی از داروها برای کودک شما ممنوع میباشد مانند داروهای مالاریا، میبانشید، مانند : کوتریماکسازول، ویتامین کا مثل : کلرکین، پریماکین، آسپرینو. ...

با انجام یک آزمایش ساده خون و اندازه گیری میزان آنزیم

G6PD می توانید متوجه شوید کودکان فاویسمی است یا نه از

بروز مشکلات بعدی جلوگیری نماید و بیاد داشته باشید که

پیشگیری همیشه بهتر از درمان است

والدین گرامی : کودک شما مبتلا به بیماری فاویسم است که G6PD علت آن نقص یا کمبود آنزیمی در گلبول قرمز به نام جی سیکس پی دی میباشد. این بیماری بدن را بمصرف باقلا، بعضی از داروها و یا ابتلا به بعضی از عفونتها ایجاد میشود.

بیماری فاویسم چه علائمی دارد؟

وقتی کودک شما در معرض بعضی از داروها قرار گیرد یا به بعضی از عفونتها مبتلا شود یا باقلا به هر شکل (خام یا پخته) مصرف نماید، 24 تا 48 ساعت و بعضی اوقات 5 تا 24 ساعت پس از تماس، علائم به شکل تب، تهوع، استفراغ، دل درد، اسهال، تیره شدن رنگ ادرار، رنگ پریدگی، سرگیجه، کم شدن ادرار و تپش قلب نمایان میشود. در صورت مشاهده علائم فوق کودک خود را به نزدیکترین مرکز درمانی برسانید.



در صورتی که کودک شما مبتلا به فاویسم

است موارد زیر را رعایت کنید:

رژیم غذایی کودک شما عادی است بجز اینکه مجاز به مصرف باقلا خام یا پخته نمیباشد. تا حد امکان از تماس کودک با پوست باقلا نیز خودداری کنید. حتی کودک فاویسمی خود را به زمین باقلا هم نبرید.

اگر به کودک فاویسمی خود شیر می دهید شما هم باید از مصرف باقلا خودداری کنید و اگر حتی یکدانه هم مصرف کردید باید تا 3 روز شیر مادر را قطع کنید.

در صورت بروز تب، کودک را با آب ولرم پا شویند و شفاف استامینوفن استفاده و به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.



در صورت تمایل جهت استفاده از خدمات مشاوره تخصصی،
سوختگی و ترمیمی از روش های زیر استفاده نمایید.
ایمیل - 1: amiralmomeninbh@sums.ac.ir
سایت - 2: amiralmomeninhospital.sums.ac.ir
3- سامانه پیامکی بیمارستان: 09912064327